



ແມ່ລູກນ້ອຍແລະອັນ ຕລ່າຍຈາກໂຮກຕັບ

- ໂຮກຕັບປະເພດບີແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍກ່ອນເວລາອັນຄວນຈາກມະເຮັງໃນຕັບຫຼືຕັບວາຍ
- ໃນອະເມຣິກາ ໑-໑໕ ຄົນເສຍຊີວິດທຸກໆມື້ຍ້ອນພະຍາດນີ້
- ໑ ໃນ ໑໐ ຂອງຄົນລາວທີ່ມີໂຮກຕັບປະເພດນີ້ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ສຶກເລີຍວ່າຕົນເອງມີພະຍາດຢູ່ໃນຕົວ
- ສຳລັບຄົນລາວການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ແມ່ນເລີ່ມຈາກແມ່ທີ່ມີໂຮກຕັບເຮື້ອຮັງສູ່ລູກໃນເວລາເດັກນ້ອຍເກີດ
- ໙໐% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ມີໂຮກຕັບຈະມີໂຮກຕັບຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຕະຫຼອດຊີວິດ ໂຊກດີທາງການແພດໄດ້ຄົ້ນພົບຢາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຮກຕັບປະເພດບີໄດ້

ຈົ່ງສອບຖາມໝໍສຳລັບຜົນການ ກວດເລືອດຫາເຊື້ອໂຮກຕັບບີ

ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ສຶກເລີຍວ່າຕົນເອງມີເຊື້ອໂຮກຕັບບີຢູ່ໃນຕົວໃນເວລາທີ່ທ່ານກຳລັງຈະເປັນແມ່ໃໝ່ນັ້ນທ່ານຄວນໄດ້ຮັບການກວດເລືອດຫາເຊື້ອໂຮກຕັບບີດັ່ງນີ້:

- ຄວນກວດເລືອດຫາໄວຣັສໂຮກຕັບບີແອນຕີເຈນ (HBsAg) ເພື່ອບອກວ່າທ່ານມີໂຮກຕັບບີເຮື້ອຮັງ (ຫຼືເປັນຜູ້ນຳເຊື້ອໄວຣັສຕັບບີ)

ສຳລັບທ່ານຍິ່ງທີ່ມີລູກນ້ອຍຫຼືກຳລັງ ຈະໃຫ້ກຳເນີດແກ່ລູກນ້ອຍຄວນ ໃຊ້ຄວາມຮະມັດຮະວັງເປັນພິເສດ

ເວລາຕັ້ງຄັນຫຼືຖືພາມານ:

ຕາມທຳມະດາທ່ານໝໍຈະບໍ່ແນະນຳໃຫ້ທ່ານສັກແອນຕີໄວຣັສອັກເສບບີເວລາທ່ານຕັ້ງຫ້ອງຫຼືຖືພາຖ້າທ່ານໄດ້ສັກຢາມີແລ້ວທ່ານຕ້ອງບອກໃຫ້ໝໍຮູ້

ເວລາເດັກເກີດໃໝ່:

ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານໂຮກຕັບບີແລະໄວຣັສຕັບອັກເສບອີມມູໄນໂກລບູລິນ (HBIG) ຕາມລາຍການດັ່ງນີ້

ອາຍ	ເດັກທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ມີໄວຣັສຕັບບີຕ້ອງຮັບ
ເວລາເກີດ	ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຕັບ ແລະ ໄວຣັສຕັບອັກເສບອີມມູໄນໂກລບູລິນ (HBIG)
ອາຍ ໑-໒ ເດືອນ	ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຄັ້ງທີ່ ໒
ອາຍ ໖ ເດືອນ	ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຕັບຄັ້ງທີ່ ໓
ອາຍ ໙-໑໑ ເດືອນ	ກວດເລືອດຫາ HBsAg ແລະ anti-HBs* ເພື່ອແນະນຳວ່າ ເດັກນ້ອຍໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນແລ້ວ

*ການກວດເລືອດຫາໄວຣັສໂຮກຕັບບີແອນຕີບີດີ (anti-HBs) ເພື່ອທົດສອບວ່າທ່ານມີພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສຕັບບີ

ການໃຫ້ກຳເນີດໂດຍການຜ່າຕັດຍັງບໍ່ປອດພ້ຍຢ່າງໃດກໍຕາມການໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຕັບບີແລະໄວຣັສຕັບອັກເສບອີມມູໄນໂກລບູລິນຈະຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານປອດພ້ຍຕໍ່ໂຮກມະເຮັງຕັບຕະຫຼອດຊີວິດ

ເມື່ອເດັກນ້ອຍອາຍ ໖ ເດືອນ:

ທ່ານຕ້ອງເອົາໄປສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ຄົບແລະໃຫ້ຖືກເວລາຕາມແຜດສັ່ງປະມານ ໙໕% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ປະຕິບັດຕາມນີ້ຈະປອດພ້ຍຈາກໂຮກມະເຮັງຕັບຕະຫຼອດຊີວິດ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ປອດພ້ຍທີ່ສຸດເພາະພະຍາດຕັບບີບໍ່ຕິດຕໍ່ທາງນົມແມ່

ແມ່ທີ່ມີເຊື້ອໂຮກຕັບບີເຮື້ອຮັງ

ຢູ່ແລ້ວ

ຢາລືມເຂົ້າຮັບການກວດຫາໂຮກຕັບ

ແມ່ທີ່ມີມະເຮັງຕັບເຮື້ອຮັງຢູ່ແລ້ວສຳຄັນທີ່ສຸດເພາະທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນອະນາຄົດແລະສະພາບຂອງລູກແລະຂອງທ່ານເອງພຽງແຕ່ທ່ານປຶກສາໝໍກວດສອບຂະໜາດແລະສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ຖືກເວລາຕາມແຜດສັ່ງທ່ານກໍ່ຈະປອດພ້ຍຈາກມະເຮັງນີ້ເຖິງທ່ານຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງກໍ່ຕາມຄວນກວດສອບດັ່ງນີ້:

ທຸກໆ	ການກວດ	ກວດຫາ
໖ ເດືອນ	ກວດເລືອດ ALT ກວດເລືອດ AFP	ຕັບທີ່ຖືກທຳລາຍ ມະເຮັງໃນຕັບ
໑ ປີ	ອັດຕຣາຊາວນ໌	ມະເຮັງໃນຕັບ

ຢ່າຮີບຮ້ອນໃນການຮັກສາ

ຜູ້ມີເຊື້ອໂຮກຕັບບີບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮັບການຮັກສາທາງຄົນຖ້າລະດັບ ALT ຂອງຜູ້ປ່ວຍຂຶ້ນສູງຜູ້ປ່ວຍຄວນຮັບຢ່າຕ້ານໄວຣັສທີ່ເໝາະສົມຄວນສອບຖາມໝໍກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາທາງສະໜິດທີ່ມີການຮັບຮອງຈາກທາງການແພດເພາະຢາບາງຈຳເປັນອາດທຳຮາຍຕັບຂອງທ່ານໄດ້

ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນເຊື້ອໂຮກຕັບເອ

ຫຼີກລ້ຽງການຕື່ມສຸຣາ

ປ້ອງກັນຄົນທ່ານຮັກ

ຄວນພາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໄປກວດຫາເຊື້ອໂຮກຕັບບີແລະຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຖ້າພົບວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ມີພູມຕ້ານທານຜແນກສາທາລະນະສຸຂະທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຕິດຕໍ່ທາທ່ານເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າລູກຂອງທ່ານປອດພ້ຍຈາກເຊື້ອໂຮກຕັບບີ